





東北大学ワクチン接種センター 追加（3回目）接種のご案内

| | |
|---------------|--|
| 接種対象者 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 宮城県内在住の方、又は、宮城県外から宮城県内へ通勤・通学している方 ◦ 市町村が発行する追加接種（3回目接種）用の接種券をお持ちの方 ※接種券が発行されていない場合は、お住まいの市町村（仙台市を除く）にご相談ください。 ◦ 接種日時点で、満18歳以上の方 ◦ 接種日時点で、2回目接種日より6ヶ月以上経過した方 |
| 場所 | <p>所在：仙台市宮城野区榴岡一丁目2-13 ヨドバシ仙台第2ビル 4階 アクセス：J R 仙台駅東口徒歩1分・仙台市営地下鉄宮城野通駅徒歩1分</p> |
| 開設時間 | <p>日中：毎日 9:30～16:30（最終受付16:15） 夜間：平日17:15～20:45（最終受付20:30）</p> |
| 接種ワクチン | <p>武田/モデルナ社製ワクチン ◎ 1・2回目接種を他会場・ファイザー社製ワクチンで受けられた方も接種できます。</p> |
| 予約方法 | <p>インターネット予約</p> <p>【予約サイトアクセス方法】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ URL：https://miyagi-mass-vaccination.jp/ ◇ キーワード検索：宮城県 ワクチン接種センター ◇ QRコードからアクセス  |
| | <p>LINE予約</p> <p>【操作の流れ】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① QRコードからLINEアプリを開く ② 「東北大学ワクチン接種センター」を友だち追加 ③ 「接種の予約」をタップ ④ 予約ページに移行  |
| | <p>電話予約</p> <p>電話番号：0570-003-503 受付時間：午前9時から午後6時まで ※ 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語に対応 ※ ナビダイヤルでの案内となるため、通話料金は発信者負担となります。</p> |
| | <p>当日直接受付枠</p> <p>予約不要でも接種を受けられる枠を設けています。接種券と身分証明書をお持ちの上、直接会場へご来場下さい。</p> <p>日中（毎日）：受付時間 9:30～15:30 夜間（平日）：受付時間17:15～19:15 ※接種時間は指定できませんので、待ち時間が発生する場合があります。</p> |
| | <p>注意事項</p> <p>接種を受ける際は、接種券原本・本人確認書類を持参下さい。 詳しくは、ポータルサイト（https://miyagi-mass-vaccination.jp/）を御確認ください。</p> |

東北大学ワクチン接種センター専用問合せ・予約窓口

電話番号：0570-003-503

受付時間：午前9時から午後6時まで（土日祝日も受付）



新型コロナウイルスワクチンについて 皆さまに知ってほしいこと

～追加(3回目)接種篇～



3回目接種により、感染予防効果や重症化予防効果を高めることができます。

日本で接種が進められているワクチンは、デルタ株等の新型コロナウイルスに対して、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されています。

一方、3回目接種により、低下した感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があることが、臨床試験や様々な疫学研究等で報告されています。



3回目接種に用いられるファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンは、同じ種類のワクチンで、いずれも薬事承認において高い効果が確認されています。

3回目接種に使用するファイザー社又は武田/モデルナ社のワクチンは、いずれも同じmRNAワクチンという種類のワクチンです。オミクロン株に対する1・2回目接種による効果は、時間の経過により低下しますが、3回目接種で回復し、3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。



3回目接種後の副反応は、いずれのワクチンも、2回目と同様の症状が見られますが、武田/モデルナ社のワクチンについては、2回目と比べて、発熱などの症状が少ないことが報告されています。

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られています。

武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半分の量となります。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目より3回目の方が多く見られます。

出典：特例承認に係る報告書より

